

Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας Αμπελιού



 Κ+Λ. Ευθυμιόδη οβεε

Προϊόντα Αμπελιού Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ- Μυκητοκτόνα



ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

- KOCIDE 2000: υδροξείδιο του χαλκού με άριστη προσκολλητικότητα, μικρότερη δόση/στρέμμα λόγω μεγέθους κόκκων και μορφής κρυστάλλου, και με την μικρότερη περιεκτικότητα σε βαριά μέταλλα
- MILDEX WG: Δύο δραστικές ουσίες (fosetyl al+ fenamidone) που καταπολεμούν όλα τα στάδια ανάπτυξης του περονόσπορου λόγω της διασυστηματικότητας και της διεισδυτικότητας.
- ARISTON WP: Cymoxanil + Mancozeb. Ένα διασυστηματικό και ένα μυκητοκτόνο επαφής για τις αρχικές και μικρές προσβολές από περονόσπορο.
- M-45: Το γνωστό μυκητοκτόνο επαφής (mancozeb) για καταπολέμηση περονόσπορου και φόμωσης.

ΩΙΔΙΟ

- CYFLAMID 5EW: Νέα δραστική ουσία για την καταπολέμηση του ωιδίου. Το προϊόν εναλλάσσεται με άλλες ομάδες μυκητοκτόνων, όπως το Karamat 2,5EW
- KARAMAT 2,5EW: Ανήκει στην ομάδα των τριαζολών, είναι νέο formulation και γίνεται εναλλαγή με άλλα προϊόντα.

ΒΟΤΡΥΤΗΣ

- MEVALONE: Αποτελείται από τρία τερπένια (essential oils) με άριστη δράση στον βοτρύτη. Θεωρείται βιολογικό προϊόν, δεν αφήνει υπολείμματα.
- NEOTOPSIN: Ένα πολύ καλό εργαλείο για τον βοτρύτη μόνο για τα οινοποιήσιμα αμπέλια.

Προϊόντα Αμπελιού Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ- Εντομοκτόνα



ΕΥΔΕΜΙΔΑ

- MIMIC SC: Καταπολέμηση της ευδεμίδας στην 1^η γενιά
- AGREE WP: *Bacillus thurigiensis*
- THERBONAL 30EC: Μη εστερική πυρεθρίνη για καταπολέμηση ευδεμίδας στην 2^η γενιά. Έχει καλή δράση και στο τζίτζικακι.

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

- HAYABUSA 25SC: Αναμένεται η έγκρισή του και αφορά τον ψευδόκοκκο του αμπελιού.
- SUNOIL 7E: Παραφινικό λάδι καθαρότητας 98,8%. Χρήση σε μεγάλη δόση για προληπτικές εφαρμογές ενάντια σε αυγά τετράνυχων.

ΘΡΙΠΑΣ

- DICARZOL 50SP-ENELSE 10SP: Και τα δύο προϊόντα εφαρμόζονται πριν την άνθηση για την καταπολέμηση του θρίπα.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ


- NISSORUN 25SC: Προληπτικές εφαρμογές για καταπολέμηση αυγών και προνύμφων κόκκινου ή κίτρινου τετράνυχου

Προϊόντα Αμπελιού Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ- Ζιζανιοκτόνα



➤ROUNDUP GOLD 30%- ROUNDUP ULTRA 48%: Τα γνωστά ποιοτικά προϊόντα glyphosate που απαιτούν σωστή δοσολογία ανά ετήσιο ή πολυετές ζιζάνιο, με max δόση ψεκαστικού διαλύματος 40-50 λίτρα/στρέμμα.

Πρόγραμμα ψεκασμών Περονοσπόρου του Αμπελιού



Πρόγραμμα ψεκασμών ωιδίου του Αμπελιού

Χειμώνας / Ανοιξη

Άνθηση

Ανάπτυξη καρπών

ΩΙΔΙΟ



Λήθαργος

Φούσκωμα

Εμφάνιση
φύλλων

Μούρο

Άνθηση

Δέσιμο
ραγών

Πριν κλείσει
το τσαμπί

Γυάλισμα
ράγας

Πριν την
ωρίμανση

Ωρίμανση

CYFLAMID 5EW

KARAMAT 2,5EW

CYFLAMID 5EW

Πρόγραμμα ψεκασμών βοτρυτή του Αμπελιού

Χειμώνας / Ανοιξη

Άνθηση

Ανάπτυξη καρπών

ΒΟΤΡΥΤΗΣ



Λήθαργος

Φούσκωμα

Εμφάνιση
φύλλων

Μούρο

Άνθηση

Δέσιμο
ραγών

Πριν κλείσει
το τσαμπί

Γυάλισμα
ράγας

Πριν την
ωρίμανση

Ωρίμανση

MEVALONE

NEOTOPSIN 70WG*

MEVALONE

**Μόνο σε Οινοποιήσιμα*

Πρόγραμμα ψεκασμών αντιμετώπισης των θριπών του Αμπελιού

Χειμώνας / Ανοιξη

Άνθηση

Ανάπτυξη καρπών

ΘΡΙΠΕΣ



Λήθαργος

Φούσκωμα

Εμφάνιση
φύλλων

Μούρο

Άνθηση

Δέσιμο
ραγών

Πριν κλείσει
το τσαμπί

Γυάλισμα
ράγας

Πριν την
ωρίμανση

Ωρίμανση

ENELSE 10 SP

THERBONAL 30 EC

Πρόγραμμα ψεκασμών εχθρών Αμπελιού

Χειμώνας / Ανοιξη

Άνθηση

Ανάπτυξη καρπών

ΕΥΔΕΜΙΔΑ



Λήθαργος

Φούσκωμα

Εμφάνιση
φύλλων

Μούρο

Άνθηση

Δέσιμο
ραγών

Πριν κλείσει
το τσαμπί

Γυάλισμα
ράγας

Πριν την
ωρίμανση

Ωρίμανση

Mimic 24SC

AGREE

THERBONAL 30 EC

Εφαρμογή στην 1 γενεά
της ευδεμίδας.

Εφαρμογή στην 2 γενεά
της ευδεμίδας.

Πρόγραμμα ψεκασμών εχθρών Αμπελιού

Χειμώνας / Ανοιξη

Άνθηση

Ανάπτυξη καρπών

ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ



Λήθαργος Φούσκωμα Εμφάνιση φύλλων Μούρο Άνθηση Δέσιμο ραγών Πριν κλείσει το τσαμπί Γυάλισμα ράγας Πριν την ωρίμανση Ωρίμανση

SUN OIL 7E

SUN OIL 7E

HAYABUSA 25SC

Πρόγραμμα ψεκασμών εχθρών Αμπελιού

Χειμώνας / Ανοιξη

Άνθηση

Ανάπτυξη καρπών

ΑΚΑΡΕΑ




Λήθαργος Φούσκωμα Εμφάνιση φύλλων Μούρο Άνθηση Δέσιμο ραγών Πριν κλείσει το τσαμπί Γυάλισμα ράγας Πριν την ωρίμανση Ωρίμανση

↑
NISSORUN 25SC

↑
NISSORUN 25SC
+
ΑΚΜΑΙΟΚΤΟΝΟ

2-3 εβδομάδες μετά την άνθηση

Πρόγραμμα ψεκασμών εχθρών Αμπελιού



TZITZIKAKIA



THERBONAL 28.75 EC

HAYABUSA 25SC

Η πλέον αποτελεσματική αντιμετώπιση γίνεται με επέμβαση εγκεκριμένου εντομοκτόνου στη 1^η γενιά νωρίς την άνοιξη όταν διαπιστωθούν 2-3 νύμφες/ φύλλο. Οι κίτρινες παγίδες με κόλλα αποτελούν καλό μέσο ανίχνευσης της παρουσίας τους. Τα 200-250 άτομα/ εβδομάδα αποτελούν αριθμητικό όριο για επέμβαση.
Καλύτερο αποτέλεσμα έχουν οι επεμβάσεις νωρίς το πρωί.